

ЦЕФТИОФУР 20%

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА И МАСТИТА ЗА 1 ИНЪЕКЦИЮ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МОЛОКУ

Назначение: применяют для лечения эндометрита и мастита у коров, а также для лечения инфекций органов дыхания бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к цефалоспорином.

Состав: цефтиофур гидрохлорид 200 мг и основа до 1 мл.

Описание: суспензия антибиотика от белого до кремового цвета, горького вкуса.

Фармакологическое действие: цефтиофур 20% относится к антибактериальным средствам группы цефалоспоринов третьего поколения.

Цефтиофур - обладает широким спектром действия в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая некоторые анаэробные бактерий и штаммы, продуцирующие β -лактамазу, в том числе: *Pasteurella (Mannheimia) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas levii*.

Механизм антибактериального действия препарата заключается в подавлении функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов - пептидогликана, что приводит к гибели бактерий.

После введения препарат быстро резорбируется с места инъекций, цефтиофур метаболизируется с образованием десфурилцефтиофура, который оказывает антибактериальное действие. Максимальная концентрация препарата в плазме крови достигается через 12 часов после введения препарата и сохраняется на терапевтическом уровне не менее 7 суток. Десфурилцефтиофур выводится главным образом с мочой (свыше 70%) и с фекалиями (12-15%).

Форма выпуска: флаконы по 100 мл.

Применение:

Перед применением тщательно взболтать.

Цефтиофур 20% вводят однократно подкожно у основания уха в дозе 1 мл на 30 кг массы животного (что эквивалентно 6,6 мг цефтиофура на 1 кг массы животного). Рекомендуется вводить не более 30 мл лекарственного препарата в одно место инъекции.

Особые указания:

Препарат предназначен для однократного введения.

При необходимости введение повторяют через 3-5 дней.

При совместном применении с антибиотиками группы аминогликозидов и/или петлевыми диуретиками, особенно при имеющемся нарушении функции почек, возможно повышение риска нефротоксичности.

Недопустимо совместное применение с антибиотиками группы тетрациклина и амфениколами, т.к. возможно значительное падение, вплоть до полной утраты, их противомикробной активности.

Запрещено смешивать цефтиофур 20% в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается проводить не ранее, чем через 20 суток после введения лекарственного препарата. Молоко можно использовать для пищевых целей без ограничений.

Срок годности: 2 года. **Хранение:** в сухом, прохладном месте.

ООО НПВП «Ветфарм»

Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Дзержинского 17

8(86130)41-7-41

01@41741.ru

41741.ru